


DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA

La dermatite nodulare contagiosa - Lumpy Skin Disease è una malattia virale dei bovini che **porta a importanti perdite economiche** in tutto il comparto bovino (diminuzione della produzione di latte, aborti, perdita delle carni e delle pelli, blocco delle movimentazioni).



Proteggiamo il patrimonio bovino della Sardegna

La dermatite nodulare contagiosa - Lumpy Skin Disease è classificata come **malattia grave** di categoria A, ossia una malattia **per la quale devono essere adottate immediatamente le misure di eradicazione** previste dalla normativa.

È fondamentale agire con rapidità e precisione perché:

- Il virus si diffonde velocemente e si trasmette con facilità, soprattutto tramite gli insetti: **fermarlo subito evita che infetti altri allevamenti**;
- Causa perdite di latte e carne, rovina la pelle degli animali e può portare alla morte: **agire subito riduce i danni**;
- Mette in pericolo i nostri allevamenti: **proteggiamo la salute degli animali e la sopravvivenza delle nostre aziende agricole**.

Riconosci i sintomi

I sintomi principali sono: **febbre alta, scolo nasale e oculare, lacrimazione, noduli** (lesioni cutanee tondeggianti) distribuiti su tutto il corpo, in particolare su testa, collo, mammelle e zona perineale, **ingrossamento dei linfonodi**.

Altri sintomi possono essere: calo dell'appetito, perdita di peso, riduzione della produzione di latte, cheratite, edema agli arti e alle regioni ventrali del tronco, aborti, morte.

In caso di sintomi:

- **Avvisa immediatamente il Servizio veterinario della ASL** e il tuo medico veterinario libero professionista di fiducia;
- **Isola gli animali sospetti**, in un'area separata dal resto della mandria;
- **Non spostare gli animali, i prodotti o i sottoprodotti**;
- **Disinfetta** sia stivali, scarpe e abbigliamento che veicoli e attrezzature che entrano ed escono dall'allevamento. **Lavati accuratamente le mani e le unghie**.

Come si trasmette

La dermatite nodulare contagiosa viene **trasmessa principalmente da insetti vettori come mosche, zanzare e zecche**, più raramente per contatto diretto. Il virus è presente in animali infetti: nelle lesioni cutanee, croste, noduli, saliva, secrezioni respiratorie, latte e materiale seminale. L'infezione può avvenire anche tramite l'ingestione di alimenti e acqua contaminati con saliva di animali infetti. **Il virus non si trasmette all'uomo**.



Previene la malattia



La vaccinazione

La vaccinazione è lo strumento più potente e affidabile per proteggere dalla dermatite nodulare contagiosa gli animali e l'intero patrimonio zootecnico, offrendo una difesa solida e duratura.

È importante sapere che, sebbene molto sicura ed efficace, alcuni studi hanno segnalato la possibilità di reazioni avverse di lieve entità in seguito alla vaccinazione: la reazione più comune è la comparsa di piccoli noduli cutanei temporanei nel punto dell'iniezione.

Eventuali anomalie o altre reazioni avverse devono essere segnalate ai Servizi Veterinari della propria ASL di riferimento.

La collaborazione di ciascuno è essenziale per monitorare l'efficacia e la sicurezza del vaccino a livello territoriale.



Altre misure di prevenzione

- Presta particolare attenzione allo stato di salute degli animali;
- Limita l'ingresso di persone e veicoli non essenziali in azienda;
- Cura attentamente la pulizia delle stalle;
- Elimina le pozze e i contenitori di acqua stagnante;
- Usa insetticidi e repellenti specifici per gli animali per proteggerli dagli insetti;
- Fai la disinfezione degli ambienti, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
"G. PIGRETTI"